

Canadian
Pari-Mutuel
Agency



Agence
canadienne
du pari mutuel

Guide d'élimination

Date de révision 3 avril 2023



Agriculture and
Agri-Food Canada

Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Canada

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada, 2023

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	3
DONNÉES SUR L'ADMINISTRATION DES DROGUES.....	5

AVERTISSEMENT

Le guide d'élimination des drogues ne constitue pas une attestation, une garantie, une assurance, une promesse ou autre, que l'usage d'une de ces drogues selon les instructions donnera les résultats prévus. Agriculture et Agroalimentaire Canada n'est nullement responsable si les résultats ne sont pas les mêmes que ceux qui sont présentés ici.

L'emploi des informations contenues dans le présent document n'annule ni ne réduit la responsabilité d'un entraîneur de s'assurer qu'avant une course, le cheval n'a reçu aucune des drogues énumérées à l'Annexe du *Règlement sur la surveillance du pari mutuel* et de se plier aux dispositions de ce règlement et des règlements provinciaux sur les courses.

Les propriétaires, entraîneurs ou toute autre personne responsable ou prenant soin d'un cheval de course sont fortement encouragés à consulter leur propre vétérinaire pour obtenir des conseils et des instructions sur l'usage de toutes les drogues.

Les directives contenues dans la présente brochure s'appliquent **UNIQUEMENT** aux produits, aux doses et aux modes d'administration énoncés et **ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers**. L'utilisation d'autres produits, comme les médicaments composés ayant le(s) même(s) ingrédient(s) actif(s), ou encore l'utilisation concomitante de plusieurs produits, peut entraîner une élimination des drogues non conforme aux présentes lignes directrices.

IMPORTANT

Chaque produit pharmaceutique dont la vente est autorisée au Canada est associé à un « numéro d'identification de drogue » (N.I.D.) qui est inscrit sur l'étiquette du produit.

L'étiquette des drogues pour utilisation en médecine vétérinaire porte la mention : « (Pour) Usage vétérinaire seulement » ou « (Pour) Usage agricole seulement ».

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES
ÉTIQUETTES DES PRODUITS**

NOTES GÉNÉRALES

1. La présente brochure est fournie aux vétérinaires et aux propriétaires de chevaux à titre de renseignement. Cette édition remplace toutes les éditions précédentes.
2. Le *Règlement sur la surveillance du pari mutuel* et l'Annexe peuvent être modifiés en tout temps.
3. Le dépistage et la corroboration, dans un échantillon officiel, d'une des drogues répertoriées dans l'Annexe doivent être considérés comme des épreuves positives en vertu du *Règlement sur la surveillance du pari mutuel*.
4. L'Agence canadienne du pari mutuel est en mesure d'offrir ce Guide d'élimination uniquement à l'égard des médicaments approuvés par Santé Canada.

Courriel : cpmawebacpm.aac@agr.gc.ca

Téléphone : 1-800-268-8835

Télécopieur : 613-759-6230

ADRESSE POSTALE :

C.P. 5904

PDF Merivale

Ottawa (Ontario) K2C 3X7

INTRODUCTION

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), dans le cadre du Programme de contrôle des drogues équinées de l'Agence canadienne du pari mutuel (ACPM), fait des recherches sur l'élimination des drogues équinées, en vue d'aider le secteur des courses. Les sujets expérimentaux sont les chevaux logés dans les écuries du Centre d'évaluation des drogues équinées d'AAC.

Il est important de souligner le caractère **approximatif** des données présentées. En effet, l'absorption et l'élimination des drogues dépendent de nombreux facteurs, notamment de la bête (âge, sexe, etc.), de son milieu de vie (alimentation, entraînement, etc.) et de la substance (dose, mélange, co-administration de drogues et/ou de suppléments, etc.). Il est à signaler que la dose varie parfois selon la préparation et le fabricant. Lisez bien l'étiquette et le mode d'emploi du produit avant de l'utiliser. Compte tenu de tous ces facteurs, chaque cheval a une vitesse de métabolisme qui lui est propre. Consultez votre vétérinaire pour obtenir des conseils et des instructions sur l'administration de drogues à votre cheval.

Le guide d'élimination n'est fourni qu'à titre d'information et ne remplace ni n'annule d'aucune façon le principe de la responsabilité de se plier au *Règlement sur la surveillance du pari mutuel* et aux règlements provinciaux sur les courses. Si ce n'est déjà fait, assurez-vous de bien connaître ces règlements.

Agriculture et Agroalimentaire Canada et les laboratoires officiels de contrôle des chevaux de courses déclinent toute responsabilité advenant que l'administration de drogues selon les quantités et les délais indiqués dans la présente publication conduise à une épreuve positive.

La page suivante décrit les renseignements généralement présentés dans la brochure pour décrire une drogue en particulier.

Nom générique (ou courant) de la drogue
p. ex. **LIDOCAÏNE**

Type

p. ex. anesthésique local (voir glossaire)

Voie d'administration

p. ex. Inhalateur Aeromask (AER)	Injection intraveineuse (IV)
Infiltration (INFIL)	Nébulisation (NEB)
Injection intra-articulaire (IA)	Orale (PO)
Injection intramusculaire (IM)	Sublinguale (SL)
Injection sous-cutanée (SC)	Topique (TOP)

Posologie et guide d'élimination (GE)

Nombre de chevaux	Dose : p. ex. 500 mg (milligrammes)
-------------------	-------------------------------------

(Juments Standardbred)	1 g	(1 gramme = 1000 mg)
------------------------	-----	----------------------

Guide d'élimination

Délai d'élimination des drogues recommandé avant une course

**Exemple : Guide d'élimination = 120 heures et plus :
À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux
serait positif au-delà de 120 heures après le dernier
traitement.**

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administrée cette drogue.

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Acétylpromazine, Acétazine, Atravet, Anatron, Acéprozine, Tranozine, Tranquavet

Type

Tranquillisant

Voies d'administration

IM, IV, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Atravet	10 mg PO	unique	24h
6	Atravet	10 mg PO	1x/jour, 3 jours	24 h
8	Atravet	50 mg PO	unique	36 h
6	Atravet	10 mg IM	unique	36 h
8	Atravet	25 mg IM	unique	36 h
6	Atravet	25 mg IV	unique	36 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

ACÉTAMINOPHÈNE

Marques de commerce et autres noms

Paracétamol, Atasol, Tylenol, Exdol, Dolophen, Paraphen, Robigesic

Type

Analgésique; Antipyrétique

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Atasol	8 g PO	unique	96 h
4	Tylenol	10 g PO	unique	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

ACIDE AMINOCAPROÏQUE

Marques de commerce et autres noms

Amicar

Type

Antifibrinolytique

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Amicar	2.5 g IV	unique	48 h
4	Amicar	5.0 g IV	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

ACIDE ÉTHACRYNIQUE

Marques de commerce et autres noms

Edecrin

Type

Diurétique

Voies d'administration

IV, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
8	Edecrin	50 mg IV	unique	36 h
4	Edecrin	200 mg PO	unique	48 h
4	Edecrin	400 mg PO	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

ACIDE MÉCLOFÉNAMIQUE

Marques de commerce et autres noms

Arquel

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Arquel	1 g PO	unique	48 h
4	Arquel	1 g PO	1x/jour, 3 jours	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

ACIDE MÉFÉNAMIQUE

Marques de commerce et autres noms

Ponstan

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
8	Ponstan	2 g PO	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

ACIDE TIAPROFÉNIQUE

Marques de commerce et autres noms

Surgam

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Surgam	2.4 g PO	unique	120 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

ATROPINE

Marques de commerce et autres noms

Sulfure d'Atropine

Type

Anticholinergique

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Sulfure d'atropine	7 mg IV	unique	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Qvar

Type

Corticostéroïde

Voie d'administration

AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Qvar	4 mg AER	unique	48h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

BÉTAMÉTHASONE

Marques de commerce et autres nom

Celestone Soluspan

Type

Corticostéroïde

Voie d'administration

IA

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Celestone Soluspan	18 mg IA	unique	6 jours

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

BROMURE D'IPRATROPIUM

Marques de commerce et autres nom

Atrovent

Type

Bronchodilatateur

Voie d'administration

AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Atrovent	0,18 mg AER	1×/jour, 3 jours	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administrée cette drogue.

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

BUPIVACAÏNE

Marques de commerce et autres noms

Marcaïne

Type

Anesthésique local

Voie d'administration

IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
8	Marcaïne	50 mg IM	unique	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Torbugesic

Type

Opioïde

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Torbugesic	5 mg IV	unique	48 h
4	Torbugesic	20 mg IV	unique	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

N-BUTYLHYOSCINE

Marques de commerce et autres noms

Buscopan

Type

Anticholinergique

Voies d'administration

IV, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Buscopan	140 mg IV	unique	24 h
4	Buscopan	140 mg PO	unique	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Kentucky Red

Type

Agent hémostatique

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Kentucky Red	100 mg IV	unique	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

CARPROFÈNE

Marques de commerce et autres noms

Rimadyl

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Rimadyl	1 g PO	2x/jour, 5 jours	120+ h

À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Reactine, PMS-Cétirizine

Type

Antihistaminique

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Reactine	200 mg PO	unique	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administrée cette drogue.

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

CHLOROPROCAÏNE

Marques de commerce et autres noms

Nesacaïne

Type

Anesthésique local

Voie d'administration

INFIL

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Nesacaïne	80 mg INFIL	unique	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

CHLORPHÉNIRAMINE

Marques de commerce et autres noms

Chlortripolon, Histalon, Novopheniram, Chlorophen, Inactihist

Type

Antihistaminique

Voie d'administration

IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
8	Inactihist	75 mg IM	unique	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

CHLORPROMAZINE

Marques de commerce et autres noms

Largactil, Chlorpromanyl, Chlorprom, G-Promazine, Apo Chlorpromazine, Novochlorpromazine

Type

Tranquillisant

Voie d'administration

IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Largactil	100 mg IM	unique	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Aservo EquiHaler

Type

Corticostéroïde

Voie d'administration

AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Aservo EquiHaler	2744 µg AER 4116 µg AER	2x/jour, 5 jours suivi par 1x/jour pour 5 jours	48 h

L'ACPM ne dispose d'aucune information sur l'élimination du ciclésonide au moyen d'autres formulations ou systèmes d'administration. Par conséquent, cette directive d'élimination doit être appliquée avec prudence à toute formulation ou à tout système d'administration autre qu'Aservo EquiHaler.

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

CIMÉTIDINE

Marques de commerce et autres noms

Tagamet, Peptol

Type

Antagoniste du récepteur H2 de l'histamine

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Tagamet	4 g PO	2x/jour, 3 jours	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

CLENBUTÉROL

Marques de commerce et autres noms

Ventipulmin

Type

Bronchodilatateur

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Ventipulmin	0.40 mg PO	2x/jour, 5 jours	28 jours

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

CLODRONATE – peut être utilisé uniquement pour les chevaux de 4 ans ou plus

Marques de commerce et autres noms

Osphos

Type

Bisphosphonate

Voie d'administration

IM, trois points d'injection différents

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
5	Osphos	720 mg IM	unique	30 jours

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Clomicalm

Type

Antidépresseur

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Clomicalm	500 mg PO	2x/jour, 4 jours	120+ h

À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

CROMOGLYCATE

Marques de commerce et autres noms

Cromovet, Cromolyn, Intal

Type

Stabilisateur de mastocytes

Voies d'administration

NEB, AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Cromovet	80 mg NEB	unique	24 h
2	Cromovet	80 mg NEB	1x/jour, 3 jours	24 h
4	Intal	10 mg AER	unique	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Periactin

Type

Antihistaminique

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Periactin	40 mg PO	1x/jour, 5 jours	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

DANTROLÈNE

Marques de commerce et autres noms

Dantrium, Suspension orale Dantrolène

Type

Relaxant musculaire

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Dantrium	1.5 g PO	unique	48 h
4	Suspension orale Dantrolène	1 g PO	1x/jour, 5 jours	60 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Sputolysin

Type

Mucolytique; Expectorant

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Sputolysin	150 mg PO	2x/jour, 4 jours	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

DÉTOMIDINE

Marques de commerce et autres noms

Dormosedan

Type

Analgésique, Sédatif

Voie d'administration

IV, SL

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Dormosedan	5 mg IV	unique	36 h
4	Dormosedan	20 mg IV	unique	72 h
4	Dormosedan	22.8 mg SL	unique	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

DEXAMÉTHASONE

Marques de commerce et autres noms

Dexamethasone 5, Dexamethasone Powder

Type

Corticostéroïde

Voies d'administration

IV, Orale (PO), IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Dexamethasone 5	25 mg IV	unique	48 h
4	Dexamethasone Powder	10 mg PO	1x/jour, 5 jours	48 h
4	Dexamethasone 5	20 mg IM	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

DEXTROMÉTHORPHANE

Marques de commerce et autres noms

Demo-Cinéol, Sedatuss, Broncho-Grippol, Tussorphan, Robidex, Balminil

Type

Antitussif

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Sirop de dextro-méthorphane	300 mg PO	unique	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Valium , Apo Diazépam

Type

Tranquillisant

Voies d'administration

IM, Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Valium	10 mg IM	unique	120+ h
4	Apo Diazépam	30 mg PO	1x/jour, 5 jours	120+ h

À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

DICLOFÉNAC

Marques de commerce et autres noms

Voltaren; Diclofénac Sodium Gel

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voies d'administration

Orale (PO), TOP (friction de la patte)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
8	Voltaren	500 mg PO	unique	36 h
4	Diclofénac Sodium gel	180 mg TOP	2x/jour, 5 jours	120 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Dolobid

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
8	Dolobid	5 g PO	unique	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

DIMÉTHYLSULFOXYDE

Marques de commerce et autres noms

DMSO, Domoso, Rimso, Kemsol

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.); Adjuvant

Voies d'administration

IV, TOP (friction de la patte)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Gel Domoso 90%	19.8 g TOP	unique	36 h
2	Solution Domoso	19.8 g IV	unique	36 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

DIPHÉNHYDRAMINE

Marques de commerce et autres noms

Benadryl, Sominex, Compoz, Nytol

Type

Antihistaminique

Voies d'administration

IM, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Benadryl	250 mg IM	unique	48 h
4	Benadryl	500 mg PO	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

DIPYRONE

Marques de commerce et autres noms

Methampyrone, Novolate, Diprone, Novin, Myovin, Dipyrone 50 %, Metamizol

Type

Analgésique, Antipyrétique

Voies d'administration

IM, IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
8	Dipyrone 50%	7.5 g IM	unique	36 h
4	Novolate	7.5 g IV	unique	36 h
4	Dipyrone 50%	10 g IM	2x/jour, 5 jours	120 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Protophylline

Type

Bronchodilatateur

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Protophylline	5 g PO	unique	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

ÉNALAPRIL

Marques de commerce et autres noms

Enacard

Type

Antihypertenseur

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Enacard	60 mg PO	1x/jour, 5 jours	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

ÉPHÉDRINE

Marques de commerce et autres noms

Antiphrine, Anti-Histamine (contient pyriline)

Type

Sympathomimétique, Anticongestif

Voies d'administration

IM, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Antiphrine	200 mg PO	unique	36 h
4	Anti- Histamine	200 mg IM	unique	36 h
4	Anti- Histamine Orale	300 mg PO	2x/jour, 6 jours	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

ERGONOVINE

Marques de commerce et autres noms

Ergonovine (maléate)

Type

Ocytocique

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Ergonovine Maléate	2 mg IV	unique	36 h
4	Ergonovine Maléate	4 mg IV	unique	60 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Ultradol

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Ultradol	2 g PO	unique	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

FAMOTIDINE

Marques de commerce et autres noms

Pepcid, Ulcidine

Type

Antagoniste du récepteur H2 de l'histamine

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Pepcid	200 mg PO	unique	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Berotec

Type

Bronchodilatateur

Voie d'administration

AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Berotec	1 mg AER	unique	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

FIROCOXIB

Marques de commerce et autres noms

Previcox

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Previcox	57 mg PO	1x/jour, 5 jours	14 jours

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Idarac

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Idarac	2 g PO	unique	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

FLUNIXINE

Marques de commerce et autres noms

Banamine

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voies d'administration

Orale (PO), IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Banamine	500 mg PO	unique	48 h
6	Banamine	500 mg IV	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Modecate

Type

Sédatif/Tranquillisant

Voie d'administration

IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Modecate	50 mg IM	unique	42 jours

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

FLURBIPROFÈNE

Marques de commerce et autres noms

Ansaid

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Ansaid	2 g PO	unique	60 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Flovent

Type

Corticostéroïde

Voie d'administration

AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
5	Flovent	2 mg AER	2×/jour, 7 jours	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administrée cette drogue.

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

FLUTICASONE/SALMÉTÉROL

Marques de commerce et autres noms

Advair 250

Type

Corticostéroïde; bronchodilatateur

Voie d'administration

AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

:

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
5	Advair 250	2,5 mg/250 µg AER	2×/jour, 7 jours	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administrée cette drogue.

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Lasix, Salix, Lasix Special

Type

Diurétique

Voies d'administration

IV, IM, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
12	Lasix	150 mg IV	unique	24 h
2	Lasix	200 mg IV	unique	24 h
12	Lasix	250 mg IV	unique	24 h
4	Lasix	400 mg IV	unique	24 h
2	Lasix	200 mg IV	1x/jour, 3 jours	24 h
2	Lasix	200 mg IM	unique	24 h
4	Lasix	400 mg IM	unique	24 h
2	Lasix	200 mg IM	1x/jour, 3 jours	24 h
4	Lasix Special	2 g PO	unique	36 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

GLYCOPYRROLATE

Marques de commerce et autres noms

Robinul

Type

Anticholinergique

Voies d'administration

IV, IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Robinul	2 mg IV	unique	36 h
4	Robinul	2 mg IM	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Éther de Gaiacol et de Glycéryle, Gaiacolate de Glycéryle, Gecolate, Robitussin

Type

Expectorant

Voies d'administration

IV, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Gecolate	2 g IV	unique	24 h
4	Sirop de Guaifénésine	2 g PO	unique	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

HYDROCHLOROTHIAZIDE

Marques de commerce et autres noms

Vetazide, Hydro Aquil, Hydrodiril, Urozide, Edemol

Type

Diurétique

Voies d'administration

IV, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Vetazide	100 mg IV	unique	60 h
4	Hydro Aquil	225 mg PO	unique	60 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

HYDROCORTISONE

Marques de commerce et autres noms

Cortavance. Solu-Cortef

Type

Corticostéroïde

Voies d'administration

TOP, IV

Dosage Regimen and Elimination Guideline (EG)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Cortavance	152 µg TOP	unique	24 h
4	Solu- Cortef	250 mg IV	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

HYDROXYZINE

Marques de commerce et autres noms

Hydroxyzine

Type

Antihistaminique

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Hydroxyzine	500 mg PO	2x/jour, 5 jours	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Motrin

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Motrin	12 g PO	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

INDAPAMIDE

Marques de commerce et autres noms

Lozide

Type

Diurétique

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Lozide	40 mg PO	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

INDOMÉTHACINE

Marques de commerce et autres noms

Indocid, Infrocin, Novométhacine

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Indocid	1 g PO	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

ISOFLUPRÉDONE

Marques de commerce et autres noms

Predef 2X

Type

Corticostéroïde

Voie d'administration ,

IA

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Predef 2X	10 mg IA	unique	6 jours

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Ketaset, Ketalar, Vetalar

Type

Anesthésique général

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Ketaset	700 mg IV	unique	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

KÉTOPROFÈNE

Marques de commerce et autres noms

Ketofen, Anafen

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Anafen	1.2 g IV	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Zaditen

Type

Stabilisateur de mastocytes

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Zaditen	20 mg PO	unique	36 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

LIDOCAÏNE

Marques de commerce et autres noms

Lignocaïne, Xylocaïne, Duracaïne, Lido, Octocaïne, Lignospan

Type

Anesthésique local

Voies d'administration

INFIL, TOP (friction de la patte)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Lidocaïne pure	150 mg INFIL	unique	24 h
4	Lidocaïne pure	500 mg TOP*	unique	36 h

*Note : Le traitement topique contient aussi 18 g DMSO.

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Metacam, Méloxicame suspension buvable

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

Voies d'administration

IV, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Méloxicame Suspension buvable	250 mg PO	unique	72 h
4	Metacam	270 mg IV	unique	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

MEPIVACAÏNE

Marques de commerce et autres noms

Carbocaïne

Type

Anesthésique local

Voies d'administration

IA, SC

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
3	Carbocaïne	250 mg IA	unique	72 h
4	Carbocaïne	300 mg SC	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

MÉTHOCARBAMOL

Marques de commerce et autres noms

Robaxin

Type

Relaxant musculaire

Voies d'administration

IV, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Robaxin	5 g IV	unique	24 h
4	Robaxin	5 g PO	unique	24 h
4	Robaxin	3 g PO	2x/jour pour 4 jours, 1x le 5 ^e jour	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

MÉTHYLPREDNISOLONE

Marques de commerce et autres noms

Dépo Medrol

Type

Corticostéroïde

Voie d'administration

IA

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Dépo medrol vétérinaire	100 mg IA	unique	6 jours
4	Dépo medrol vétérinaire	200 mg IA	unique	14 jours

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Relafen

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Relafen	5 g PO	unique	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

NAPROXÈNE

Marques de commerce et autres noms

Naprosyn, Equiproxen

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Naprosyn	4.5 g PO	unique	96 h
4	Equiproxen	2 g PO	2x/jour, 5 jours	120 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Tilade, Alocril

Type

Stabilisateur de mastocytes

Voie d'administration

AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
----------	---------	-----------	----------------	----

4	Tilade	16 mg AER	unique	24 h
---	--------	-----------	--------	------

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

OXAPROZIN

Marques de commerce et autres noms

Daypro

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Daypro	4.8 g PO	unique	120+ h

À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Talwin

Type

Opioïde

Voie d'administration

IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Talwin	300mg IM	unique	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

PENTOXIFYLLINE

Marques de commerce et autres noms

Trental, Navicon

Type

Dérivé de xanthine

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Trental	4 g PO	unique	48 h
4	Navicon	2 g PO	2x/jour, 4 jours	48 h
4	Navicon	2 g PO	3x/jour, 5 jours	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Phénothiazine

Type

Antihelminthique

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Phénothiazine Drench Grade en poudre	4.75 g PO	unique	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

PHÉNYLBUTAZONE

Marques de commerce et autres noms

Bute, Butazolidin, Dinz, Butazone, Equipalazone, Azrabute, Centrabute

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voies d'administration

IV, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
2	Phénylbutazone Injectable	2g IV	unique	48h
2	Phénylbutazone Injectable	2g IV	1x/jour, 5 jours	48h
2	Phénylbutazone Injectable	3 g IV	unique	96 h
2	Phénylbutazone Injectable	3 g IV	1x/jour, 3 jours	96 h
2	Bute	3 g PO	unique	96 h
2	Bute	3 g PO	1x/jour, 3 jours	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Dilantin, Suspension Phénytoïne

Type

Anticonvulsif

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Suspension Phénytoïne	3 g PO	2x/jour, 3 jours	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

PIROXICAME

Marques de commerce et autres noms

Feldene

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Feldene	100 mg PO	unique	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

PREDNISOLONE

Marques de commerce et autres noms

Solu Delta Cortef; succinate de sodium de prednisolone
Acétate de prednisolone

Type

Corticostéroïde

Voie d'administration

IV, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
8	Acétate de prednisolone	400 mg PO	2x/jour, 5 jours	48 h
4	Solu Delta Cortef	500mg IV	unique	48 h
4	Solu Delta Cortef	100 mg IV	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

PREDNISONNE

Marques de commerce et autres noms

Deltasone

Type

Corticostéroïde

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Deltasone	1 g PO	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

HYDROCHLORURE DE PROCAÏNE

Marques de commerce et autres noms

Novocaïne

Type

Anesthésique local

Voie d'administration

INFIL

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Novocaïne	80 mg INFIL	unique	48 h
4	Novocaïne	120 mg INFIL	unique	48 h
4	Novocaïne	160 mg INFIL	unique	48 h
4	Novocaïne	200 mg INFIL	unique	48 h
4	Novocaïne	1600 mg INFIL	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

PÉNICILLINE G PROCAÏNE

Marques de commerce et autres noms

Derapen-A, Azimycine, Cillimycine, Penamycine, Suspension PenStrep, Pen DI Strep, Éthacilline, Diathal

Type

Antibiotique (contient un anesthésique local : Procaïne)

Voies d'administration

IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Derapen A	2 million IU IM	unique	425 h
4	Azimycin	4 million IU IM	unique	425 h
4	Cillimycin	4 million IU IM	unique	425 h
4	Penamycin	4 million IU IM	unique	425 h
4	Suspension Pen-Strep	4 million IU IM	unique	425 h
4	Pen Di Strep	4 million IU IM	unique	425 h
4	Pen Di Strep	4 million IU IM	1x/jour, 5 jours	425 h

UI = Unités internationales (1 million UI pénicilline G procaïne contiennent 424 mg procaïne)

...continué sur la page suivante

PÉNICILLINE G PROCAÏNE (suite)

Voir aussi p. 108

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Éthacillin	6 million IU IM	unique	425 h
4	Diathal*	2 million IU IM	unique	425 h

*Contient également 200 mg hydrochlorure de procaïne

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

PYRILAMINE

Marques de commerce et autres noms

Histosol, Anti-Histamine (contient éphédrine)

Type

Antihistaminique

Voies d'administration

IM, orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Histosol	500 mg IM	unique	36 h
4	Anti- Histamine	750 mg PO	2x/jour, 6 jours	36 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Zantac

Type

Antagoniste du récepteur H2 de l'histamine

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Zantac	3 g PO	2x/jour, 4 jours	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

RESERPINE

Marques de commerce et autres noms

Reserpine

Type

Tranquillisant

Voie d'administration

IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Reserpine	2.5 mg IM	unique	7 jours

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Sedivet

Type

Analgésique Sédatif

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Sedivet	20 mg IV	unique	36 h
4	Sedivet	50 mg IV	unique	36 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

SALBUTAMOL

Marques de commerce et autres noms

Ventolin, APO Salvent

Type

Bronchodilatateur

Voie d'administration

AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Ventolin	0.8 mg AER	unique	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Serevent

Type

Bronchodilatateur

Voie d'administration

AER

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Serevent	0.25 mg AER	unique	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

SULINDAC

Marques de commerce et autres noms

Clinoril

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Clinoril	1.0 g PO	unique	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Mobiflex

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Mobiflex	200 mg PO	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

TERBUTALINE

Marques de commerce et autres noms

Bricanyl, Brethine

Type

Bronchodilatateur

Voies d'administration

Orale (PO), SC

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Brethine	1 mg SC	unique	72 h
4	Bricanyl	40 mg PO	unique	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

THÉOPHYLLINE

Marques de commerce et autres noms

Aminophylline : Somophyllin, Aminophyl, Corophyllin, Phyllocontin

Théophylline : Acet-Am, Quibron, Asthmophylline, Theolair, AA-THEO LA

Type

Bronchodilatateur

Voie d'administration

IV, Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Aminophylline	1.5 g IV	unique	96 h
4	AA-THEO LA	4 g PO	unique	72 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

TRIAMCINOLONE (ACÉTONIDE)

Marques de commerce et autres noms

Kenalog-10, Vitaderm-K.C.

Type

Corticostéroïde

Voies d'administration

IA, TOP

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Kenalog-10	20 mg IA	unique	6 jours
4	Vitaderm-K.C.	10 mg TOP	unique	24 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

TRICHLORMÉTHIAZIDE

Marques de commerce et autres noms

Naquasone

Type

Diurétique

Voies d'administration

Orale (PO), IV, IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Naquasone	100 mg PO	unique	48 h
4	Naquasone	200 mg PO	unique	48 h
4	Naquasone	100 mg IV	unique	48 h
4	Naquasone	100 mg IM	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

TRIPÉLENNAMINE

Marques de commerce et autres noms

Vetastim

Type

Antihistaminique

Voie d'administration

IM

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Vetastim	400 mg IM	unique	36 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Quadrisol

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

Voies d'administration

Orale (PO), IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Quadrisol	1 g PO	1x/jour jours 1 & 5, 0.5 g 2x/jour jours 2-4	48 h
4	Quadrisol	1 g IV	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

XYLAZINE

Marques de commerce et autres noms

Rompun

Type

Analgésique; Sédatif

Voie d'administration

IV

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
4	Rompun	500 mg IV	unique	48 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Marques de commerce et autres noms

Zomax

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voie d'administration

Orale (PO)

Posologie et guide d'élimination (GE)

#Chevaux	Produit	Dose/Voie	Administration	GE
2	Zomax	0.5 g PO	unique	96 h
2	Zomax	0.5 g PO	1x/jour, 3 jours	96 h
2	Zomax	1 g PO	unique	96 h
2	Zomax	1 g PO	1x/jour, 3 jours	96 h

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Les lignes directrices contenues dans la présente brochure ne s'appliquent pas nécessairement aux produits composés et ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

DROGUE: Acide salicylique

Acide acétylsalicylique (AAS, Aspirine)

Salicylate de méthyle

TYPE DE DROGUE: Antipyrétique/antalgésique/anti-inflammatoire (D.A.I.N.S): AAS; Révulsif; Salicylate de méthyle; kérolytique; acide salicylique

MARQUES DE COMMERCE: Acetophen, Entrophen, Aspir (AAS), ; autres (salicylate de méthyle)

ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT	PRÉSENTATION	POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION	NOMBRE		TAUX D'ACIE SALICYLIQUE
			DE.	CHEVAUX	
Acide acétylsalicylique	Acetophen	11.7 g Orale	12		SANG > 6.5µg/mL URINE > 750µg/mL
					24 h*

* Au cours de cette expérience, on a également détecté de l'acide acétylsalicylique dans l'urine de cheval jusqu'à 14 heures après l'administration.

On n'a observé aucun taux supérieur à 750 µg/mL dans l'urine ou à 6.5 µg/mL dans le sang à la suite d'administration d'aliments pour bétail.

Tous les résultats ci-dessus ont été obtenus au cours d'expériences et d'analyses d'urine de cheval effectuées en utilisant les méthodes courantes. Nous soulignons que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré une drogue métabolisée en acide salicylique.

NOTES EXPLICATIVES

A. ANNEXE

La présence des substances suivantes est interdite dans un échantillon officiel.

1. Toute substance pour laquelle les autorités n'ont pas autorisé l'utilisation en médecine vétérinaire (y compris tous les médicaments humains et tous les produits de l'étranger).
2. Toute substance de la liste (y compris certaines substances pour lesquelles les autorités ont autorisé l'utilisation en médecine vétérinaire).
3. Toute substance qui peut compromettre l'analyse des échantillons officiels visant le dépistage des substances mentionnées en annexe.
4. Toute substance pour laquelle les autorités ont délivré récemment une autorisation de 240 jours, et toute substance dont l'autorisation a été annulée.

IMPORTANT
Chaque produit pharmaceutique qui a reçu l'autorisation de vente au Canada a un « numéro d'identification de drogue » (N.I.D.) qui est inscrit sur l'étiquette du produit.
L'étiquette des médicaments pour utilisation en médecine vétérinaire porte la mention: « (Pour) Usage vétérinaire seulement » ou « (Pour) Usage agricole seulement ».
LISEZ ATTENTIVEMENT LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS

Les directives contenues dans la présente brochure ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Un seuil quantitatif a été établi pour certaines substances. Un échantillon officiel ne sera positif que si la concentration de ces substances est supérieure au seuil quantitatif et qu'il se conforme à tout autre règlement pertinent. Par exemple, voir l'alinéa B (ci-dessous).

B. PÉNICILLINE G PROCAÏNE

Dans certaines conditions, l'analyse quantitative d'un échantillon de sang peut servir à classer un résultat positif ou négatif du dépistage de la procaïne suite à l'administration de produits contenant de la pénicilline G procaïne.

Les conditions sont les suivantes :

1. Si l'administration finale d'un produit contenant de la pénicilline G procaïne à une dose allant jusqu'à 6 millions UI a eu lieu au moins 48 heures avant l'heure prévue du début de la course à laquelle doit participer le cheval.
2. Si l'administration finale d'un produit contenant de la pénicilline G procaïne à une dose allant jusqu'à 9 millions UI a eu lieu au moins 96 heures avant l'heure prévue du début de la course à laquelle doit participer le cheval. Les dosages excédant 9 millions UI peuvent exiger un plus long retrait que 96 heures.
3. Si des procédures autorisées ont été mises en place pour avertir les agents provinciaux et le personnel de prélèvement.
4. Si des procédures autorisées ont été mises en place pour prélever un échantillon de sang.
5. Si une déclaration a été faite et un échantillon de sang fourni conformément à l'article 170 du *Règlement sur la surveillance du pari mutuel*.

Si toutes les conditions sont respectées, l'échantillon positif ne sera pas reconnu comme contenant de la procaïne, à moins que la concentration dans le sang n'excède 0,025 µg/mL ou 25ng/mL, tel que décrit au paragraphe 3, de l'annexe.

Nous soulignons que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament. Agriculture et Agroalimentaire Canada n'est nullement responsable si les résultats ne sont pas les mêmes que ceux qui sont présentés ici.